

Klausur, 25.07.2011

Lineare Algebra I für Informatiker, SS 2011, Dr. T. Hanke

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Bearbeiten Sie die folgenden Rechenaufgaben und schreiben Sie die Ergebnisse in den dafür vorgesehenen Platz. Sie brauchen Ihre Ergebnisse **nicht** zu begründen, für Begründungen und Ansätze gibt es **keine** Punkte. Für die richtige Antwort bekommen Sie die angegebene Punktzahl. Für eine falsche Antwort gibt es **Null** Punkte.

1 Sei $n \geq 2$ und V ein n -dimensionaler \mathbb{R} -Vektorraum mit Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ und sei die lineare Abbildung $\varphi : V \rightarrow V$ definiert durch $b_1 \mapsto 0$, $b_i \mapsto b_{i-1}$ für $i = 2, \dots, n-1$, und $b_n \mapsto b_{n-1} + b_n$.

(a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom χ_φ von φ . (3 Punkte)

$$\chi_\varphi = \boxed{\phantom{\text{Polynom}}}$$

(b) Bestimmen Sie die Eigenwerte von φ mit ihren algebraischen Vielfachheiten. (2 Punkte)

$$\boxed{\phantom{\text{Eigenwerte}}}$$

(c) Geben Sie Basen für die Eigenräume von φ an. (2 Punkte)

(d) Für welche n ist φ diagonalisierbar? $\boxed{}$ (1 Punkt)

2 Es sei $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ der Körper mit 2 Elementen. Bestimmen Sie die Menge aller $x \in \mathbb{F}_2^5$ mit $Ax = b$, wobei $A \in \mathbb{F}_2^{4 \times 5}$ und $b \in \mathbb{F}_2^4$ die folgenden sind: (4 Punkte)

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ergebnis:

$$\boxed{\phantom{\text{Ergebnis}}}$$

3 Sei die lineare Abbildung φ definiert durch:

$$\varphi : \mathbb{R}^{1 \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot x \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Geben Sie die Abbildungsmatrix von φ bezüglich der Standardbasis \mathcal{E} von $\mathbb{R}^{1 \times 3}$ und der geordneten Basis $\mathcal{B} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ von $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ an: (3 Punkte)

$${}^{\mathcal{B}}M^{\mathcal{E}}(\varphi) =$$

(b) Was ist der Rang von φ ?

$$\text{Rang}(\varphi) = \boxed{} \quad (1 \text{ Punkt})$$

(c) Geben Sie eine Basis \mathcal{C} von $\text{Kern}(\varphi)$ an.

(2 Punkte)

$$\mathcal{C} =$$

(d) Geben Sie eine Basis \mathcal{D} von $\text{Bild}(\varphi)$ an.

(2 Punkte)

$$\mathcal{D} =$$

4

Wir betrachten \mathbb{R}^3 mit dem Standardskalarprodukt. Sei $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ und

$$E = \langle v_1, v_2 \rangle.$$

(a) Bestimmen Sie einen Vektor v'_2 , der v_1 zu einer Orthogonalbasis von E ergänzt.

$$v'_2 = \boxed{} \quad (2 \text{ Punkte})$$

4

(Fortsetzung)

(b) Berechnen Sie die orthogonale Projektion u' von $u = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ auf E .

$$u' = \boxed{} \quad (2 \text{ Punkte})$$

(c) Berechnen Sie den Cosinus des Winkels α zwischen dem Vektor u aus Teil (b) und E .

$$\cos(\alpha) = \boxed{} \quad (1 \text{ Punkt})$$

5

Für $t \in \mathbb{R}$ sei $B_t = \begin{pmatrix} 3 & t \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

(a) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von B_t . (1 Punkt)

(b) Bestimmen Sie die Determinante von B_t . (1 Punkt)

(c) Für welche Werte von t ist B_t invertierbar? (1 Punkt)

(d) Für welche $t \in \mathbb{Z}$ ist B_t invertierbar in $\mathbb{Z}^{2 \times 2}$? (1 Punkt)

(e) Für welche $t \in \mathbb{R}$ besitzt B_t einen Eigenvektor? (1 Punkt)

(f) Für welche $t \in \mathbb{R}$ ist B_t diagonalisierbar? (1 Punkt)

(g) Für welche $t \in \mathbb{C}$ ist B_t diagonalisierbar, wenn wir B_t als Matrix in $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ auffassen? (2 Punkte)

(h) Für welche $t \in \mathbb{R}$ ist B_t triangulierbar? (1 Punkt)

(i) Geben Sie eine Matrix $T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ an, für die $T^{-1}B_{-8}T$ eine Diagonalmatrix ist.

$$T = \boxed{} \quad (2 \text{ Punkte})$$

Beantworten Sie die folgenden Aufgaben schriftlich. Beweisen Sie alle Ihre Behauptungen. Schreiben Sie auf **jedes Blatt** Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Fangen Sie jede Aufgabe auf einer neuen Seite an.

- | | |
|---|---|
| 6 | <p>Sei V ein endlich-dimensionaler euklidischer Vektorraum und \mathcal{B} eine Orthonormalbasis von V. Sei $\varphi \in \text{End}(V)$. Dann heißt φ <i>selbstadjungiert</i>, wenn für alle $v, w \in V$ gilt $\langle \varphi(v), w \rangle = \langle v, \varphi(w) \rangle$. Zeigen Sie:</p> <p>(a) φ ist genau dann selbstadjungiert, wenn $M^{\mathcal{B}}(\varphi)$ symmetrisch ist. (3 Punkte)</p> <p>(b) Sei φ selbstadjungiert. Dann ist für jeden φ-invarianten Unterraum $U \leq V$ auch U^\perp ein φ-invarianter Unterraum. (2 Punkte)</p> |
| 7 | <p>Sei K ein Körper, V ein K-Vektorraum und $\varphi \in \text{End}(V)$. Sei M eine Menge von Eigenvektoren von φ zu paarweise verschiedenen Eigenwerten. Zeigen Sie, dass M linear unabhängig ist. (5 Punkte)</p> |
| 8 | <p>Sei $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ mit charakteristischem Polynom $\chi_A(X) = X^3 - 3X^2 + 2X$. Was ist der Rang von A? Beweisen Sie Ihre Aussage. (4 Punkte)</p> |